

# さといも疫病対策情報

平成30年5月31日  
北諸県地区営農振興協議会園芸部会

梅雨に入りましたが、これから疫病の発生しやすい条件となりますので、発  
病前からのジーファイン水和剤の定期的な散布をお願いします。

また、気温が高くなり、害虫が発生しやすい状況になります。疫病防除と  
同時に、害虫防除も行いましょう。

近年、疫病の発生が早かったほ場は、①除草対策、②排水対策、③計  
画的な防除が実行されていない管理不良ほ場でした。適正な管理に努めま  
しょう。

【参考】ジーファイン水和剤、アミスター20フロアブルとの混用事例

※展着剤は、スカッシュを使用

対象害虫	農薬名	使用倍数	ジーファイン 水和剤	アミスター20 フロアブル
ハスモンヨトウ *ハダニ類	コテツフロアブル	2000倍	×	○
ハスモンヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2000倍	×	○
ハスモンヨトウ	フレオフロアブル	1000倍	○	○
ハダニ類 *アブラムシ類	サンマイトフロアブル	1000倍	○	○
アブラムシ類	アドマイヤー顆粒水和剤	10,000倍	×	○

★ 条件によっては薬害が発生することもありますので、あらかじめご了承ください。

★「\*」はさといも以外で登録のある害虫です。

- アミスター20フロアブルは発病確認後に散布してください。
- 薬剤を散布する前に、ボトル等裏面ラベルの内容を確認しましょう。
- 農薬散布について不明な点がありましたら、北諸県農業改良普及センターにお問い合わせください。

疑わしい株を見つけたら、北諸県農業改良普及センター、都城市、三股町  
JA 都城のいずれかへご連絡ください