

さといも疫病対策情報（重要）

平成30年6月19日
北諸県地区営農振興協議会園芸部会

県内（ほかの産地）でさといも疫病の発生が確認されました。

平均気温は6月上旬には、25℃を超える日が観測されています。今後、1週間は、降雨が続くと予想されていることから、疫病の発生の好適条件を迎えております。

発生が確認された場合は、アミスター20フロアブルの散布をお願いします。

病徴が進行しているときは1週間間隔で2回散布してください。

なお、ご自身のほ場で発生が確認されるまでは、ジーファイン水和剤の予防散布を継続してください。

※ アミスター20フロアブルは使用回数が3回までに限られていますので、散布回数にご注意ください。

<さといも疫病の病斑>



(葉の表)



(葉の裏)



(拡大した病斑)

- 日射が強く、温度が高い時間に散布すると、薬害が発生することがありますので、ご注意ください。
- 薬剤を散布する前に、ボトル等裏面ラベルの内容を確認しましょう。
- 農薬散布について不明な点がありましたら、北諸県農業改良普及センターにお問い合わせください。

疑わしい株を見つけたら、北諸県農業改良普及センター(0986-38-1554)、都城市(0986-23-2425)、三股町(0986-52-1111)、JA 都城(0986-38-6691)のいずれかへご連絡ください